

معیار ریچموند برای بررسی بیداری، (آزیتاسیون – سداسیون) RASS

Richmond Agitation Sedation Score

مقیاس	عنوان	توضیح
+۴	پرخاشگر	خشمگین – آسیب به پرسنل
+۳	خبی آژیه	لوله و اتصالات را به صورت پرخاشگرانه می کشد.
+۲	آژیه	بی قراری با وئیلاتور و حرکات متناوب بی هدف
+۱	بی قرار	مضطرب – حرکات بدون پرخاشگری
۰	هوشیار – آرام	توجه به مراقبت دهنده
-۱	خواب آلودگی	کاملاً هوشیار نیست ولی با صدا چشم باز می کند و ارتباط بیش از ۱۰ ثانیه است.
-۲	بی‌هوشی ضعیف	به طور مختصر به صدا جواب می‌دهد ولی ارتباط کمتر از ۱۰ ثانیه است.
-۳	بی‌هوشی متوسط	چشم‌ها را بی هدف باز می کند
-۴	بی‌هوشی عمیق	به تحریکات فیزیکی جواب می‌دهد.
-۵	بیدار نمی شود	به صدا و تحریکات فیزیکی پاسخ نمی‌دهد.

۳ مرحله دارد

۱- مشاهده: فقط نگاه کنید (۰ الی ۴)

۲- درخواست کلامی (۱- الی ۳-)

۳- تحریک فیزیکی (۴- الی ۵-)

واحد ایمنی بیمار بیمارستان دکتر شریعتی البرز