

واحد ارتقا سلامت بیمارستان شریعتی البرز

در صورت مراجعه به پزشك و مراکز درمانی به هر علتی حتما بیان کنید چه داروهایی در منزل مصرف می کنید

داکسی سایکلین

یک آنتی بیوتیک می باشد

- داکسی سیکلین را همراه با آب فراوان مصرف نمایید تا مطمئن شوید که دارو به معده برسد زیرا بروز (التهاب مری) کاهش می یابد.
- حداقل ۹۰ دقیقه بعد از مصرف دارو دراز نکشید زیرا باعث ایجاد التهاب و زخم در مری شود.



در صورت داشتن مشکلات کلیوی و معده به پزشك خود اطلاع دهید

واحد ارتقا سلامت بیمارستان شریعتی البرز

در صورت مراجعه به پزشك و مراکز درمانی به هر علتی حتما بیان کنید چه داروهایی در منزل مصرف می کنید

- در صورت ایجاد مشکلات گوارشی، می توان کپسول یا قرص داکسی سایکلین را همراه با غذا و یا شیر مصرف نمود.
- دارو باید سر وقت معین مصرف شود و علیرغم احساس بهبودی، درمان را مطابق دستور ادامه دهید.
- از مصرف آنتی اسید، مکمل های حاوی کلسیم، منیزیم و آهن با فاصله ۱ تا ۳ ساعت پس از مصرف داکسی سیکلین، پرهیز نمایید.
- مصرف همزمان داکسی سایکلین با قرص های ضد بارداری باعث می شود اثر قرص های ضد بارداری کاهش یابد



در صورت داشتن مشکلات کلیوی و معده به پزشك خود اطلاع دهید