

علائم اولیه ی استیونس جانسون، بسیار ساده هستند و در ابتدا ممکن است با یک سرماخوردگی ساده اشتباه گرفته شود و همین امر علت پیشرفت این بیماری در بسیاری از موارد است.

سندروم استیونس جانسون چیست

استیونس جانسون (SJS) یک واکنش حساسیتی از نوع چهارم (ایدیوسنکراتیک و تاخیری) است

-عارضه با سرفه های همراه با خلط غلیظ و چرکی، سردرد، بی قراری، احساس درد در مفاصل شروع می شود پس از آن ممکن است در سطح بدن بیمار ضایعات پوستی قرمز، متورم، پوسته دهنده، تاول، زخم و در نهایت نکروز بروز کند که معمولا این علائم از صورت آغاز می شود اما بطور کلی بیشتر در نواحی بالاتر از قفسه ی سینه بروز می کند. ضایعات پوستی استیونس جانسون می توانند کهیر مانند و بهم پیوسته باشند اما عموما بدون خارش هستند.

-محل بروز ضایعات در هر نقطه ای از بدن می تواند باشد اما بیشتر در کف دست و پا، ناحیه ی پشت دست و سطح داخلی ساعد و بازو مشاهده شده است.

-راش های پوستی کهیر مانند نیز بیشتر بر روی تنه نمایان می شوند

-در ادامه ضایعات چشمی بروز می کنند که در معاینه ی چشمی علایمی همچون برگشتگی مژه ها به داخل رفته رفته علایم داخلی با پیشرفت ضایعات نمایان می شوند و زندگی بیمار را به خطر می اندازد

استیونس جانسون یک اختلال سیستمیک جدی و خطرناک است که سرعت در تشخیص آن و شروع اقدامات درمانی در حفظ جان بیمار بسیار مهم است

واحد آموزش بیمارستان شریعتی البرز

علائم اولیه ی استیونس جانسون، بسیار ساده هستند و در ابتدا ممکن است با یک سرماخوردگی ساده اشتباه گرفته شود و همین امر علت پیشرفت این بیماری در بسیاری از موارد است.

چه کسانی بیشتر در معرض خطر استیونس جانسون هستند؟

۱-نقص سیستم ایمنی

۲-مصرف هم زمان دو یا چند قلم از داروهایی که عارضه استیونس جانسون با آنها گزارش شده

علت بروز این عارضه چیست؟

✓ بروز این عارضه در ۲۵ تا ۵۰ درصد موارد علت مشخصی ندارد

✓ در باقی موارد عواملی همچون عفونت ها، بدخیمی ها و مصرف برخی داروها با بروز این عارضه ارتباط داشته اند.

✓ عارضه ی دارویی شایع ترین علل بروز استیونس جانسون در بزرگسالان می باشد و ابتلا به این سندرم در اثر عفونت بیشتر در اطفال دیده شده است

✓ بدخیمی ها

استیونس جانسون یک اختلال سیستمیک جدی و خطرناک است

که سرعت در تشخیص آن و شروع اقدامات درمانی در حفظ جان بیمار بسیار مهم است

واحد آموزش بیمارستان شریعتی البرز

علائم اولیه ی استیونس جانسون، بسیار ساده هستند و در ابتدا ممکن است با یک سرماخوردگی ساده اشتباه گرفته شود و همین امر علت پیشرفت این بیماری در بسیاری از موارد است.

داروهایی که تا کنون عارضه ی استیونس جانسون با آنها گزارش شده است:

آنتی بیوتیک ها شایع ترین علت بروز استیونس جانسون بوده اند و بدنبال آن ضددردهای غیر استروئیدی، ضدسرفه و سرماخوردگی، داروهای ضدصرع، ضد نفرس و برخی داروهای ضد ویروس نیز گزارشاتی مبنی بر بروز این عارضه را داشته اند.

لیست برخی داروها که استیونس جانسون در اثر مصرف آنها گزارش شده عبارتند از:

سیپروفلوکساسین، پنی سیلین ها و سولفادیازین ها، آزیترومایسین، فنی توبین، کاربامازپین و سرترالین، پنتوپرازول، ترامادول، پیروکسیکام . ملوکسیکام و...می باشد.

تشخیص سندرم استیونس جانسون: بیوپسی

اقدامات درمانی جهت کنترل استیونس جانسون بدین صورت می باشد:

✓ علامت درمانی

قطع هرگونه دارو که منجر به بروز این عارضه شده است

تزریق واکسن کزاز

استیونس جانسون یک اختلال سیستمیک جدی و خطرناک است

که سرعت در تشخیص آن و شروع اقدامات درمانی در حفظ جان بیمار بسیار مهم است