

به نام خدا

پلاویکس

نام تجاری : کلپیدوگرل

شکل دارویی: قرص ۷۵ میلی گرم

قرص پلاویکس

(Plavix) که با نام های دیگری همچون قرص کلپیدوگرل (clopidogrel) و قرص اسویکس (Osuix) شناخته می شود و به پیشگیری از به هم چسبیدن پلاکت های خون و جلوگیری از تشکیل لخته کمک می نماید. این دارو باعث می شود خون به راحتی در عروق شما جریان یافته و اکسیژن به ارگان های حیاتی مانند قلب و مغز برسد و نتیجه آن پیشگیری از بروز سکته قلبی و مغزی است. قرص پلاویکس بیشتر برای افراد با سابقه سکته و یا زمان انجام آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی استفاده می شود.

موارد مصرف :

ابتلا به تصلب شرایین (گرفتگی عروق)

سکته قلبی

انجام آنژیوگرافی یا آنیوپلاستی

سکته مغزی

در موارد زیر پیش از مصرف این دارو، با پزشک صحبت کنید :-

اختلالات خونی یا انعقاد خونی مانند هموفیلی

سابقه هر گونه خونریزی از جمله زخم فعال معده یا جراحی یا جراحی که در چند هفته اخیر داشته اید.

سابقه اختلال کلیوی یا کبدی

سابقه حساسیت به پلاویکس

در صورت بارداری یا شیردهی

وجود اختلالات خونی

لیست داروهای مصرفی (حتی داروهای بدون نسخه، مکمل و گیاهی) را به همراه خود داشته باشید.

سابقه سکته قلبی یا مغزی

قصد انجام جراحی (جراحی دندان و)



در دوره مصرف پلاویکس، به این نکات توجه فرمائید:

-دارو را دقیقاً همانطور که توسط پزشک شما تجویز می گردد مصرف کنید.

-داروی خود را به موقع و منظم مصرف کنید و از مصرف بیشترین مقدار از مقداری که پزشک تجویز کرده است خودداری کنید.

-در دوره مصرف این دارو مراقب هر گونه خونریزی در بدن خود باشید، مثل کار کردن با وسایل خطرناک که احتمال زخمی شدن دارد و حتی مسواک زدن که باعث خونریزی لثه می شود یا اصلاح کردن.

قبل از انجام هر گونه عمل جراحی و دندانپزشکی، باید مصرف پلاویکس را قطع کنید. در صورتیکه عمل جراحی در پیش دارید، مصرف این دارو را به پزشک خود گزارش دهید.

-در صورتیکه در دوره مصرف پلاویکس، هر گونه ضربه ای به سر شما وارد گردید، سریعاً به پزشک مراجعه کنید. حتی اگر هیچ حس و علامت بدی در خود مشاهده نمی کنید.

-دارو را در دمای اتاق و دور از گرما و رطوبت نگهداری کنید.

-اجتناب از انجام فعالیت هایی که ممکن است خطر خونریزی یا آسیب جدی را افزایش دهد.

-در صورت فراموش کردن دوز دارو، به محض اینکه دوز فراموش شده را به یاد آوردید آن را مصرف کنید. اگر تقریباً نزدیک به نوبت بعدی مصرف دارو است، از مصرف دوز فراموش شده خودداری کنید.

-برای جبران میزان داروی فراموش شده، از دو برابر کردن دوز بعدی جداً خودداری فرمائید.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

بیمارستان دکتر علی شریعتی

راهنمای مصرف پلاویکس



در صورت مشاهده موارد زیر، دارو را قطع کرده و به پزشک مراجعه کنید:

- مدفوع خونی یا تیره رنگ
- سرفه خونی
- وجود لکه های بنفش یا قرمز در پوست
- پوست رنگ پریده، ضعف، تب یا یرقان (زردی چشم و پوست)
- کبودی، خونریزی غیر معمولی از دهان، واژن، بینی، مقعد

سابقه هر نوع بیماری قبلی و مصرف دارو را به پزشک خود اطلاع دهید

واحد ارتقا سلامت بیمارستان دکتر شریعتی نرسیده به
ماهدشت کرج

گروه هدف: کلیه مراجعین

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۶۳۷۳۰۵۰۱

تهیه شده : اردیبهشت ۱۴۰۳

منابع: داروهای ژنریک ایران دکتر رامین خدام

-این دارو را می توان با یا بدون غذا مصرف کرد

-مصرف پلاویکس با گریپ فروت و آب گریپ فروت تداخل شدیدی دارد و نباید به صورت همزمان مصرف گردد.

-در دوره مصرف پلاویکس، خوراکی هایی که باعث رقیق شدن خون می شوند، مانند سیر، زردچوبه، کلم بروکلی، زنجبیل، نعناع، آویشن، روغن زیتون و ... را با احتیاط مصرف کنید.

-مصرف ویتامین E و و مکمل های غذایی را به پزشک خود اطلاع دهید

-در صورت مشاهده نشانه های واکنش حساسیتی به داروی پلاویکس مانند : راش پوستی، کهیر، اشکال در تنفس، تورم صورت، لب، زبان یا گلو با اورژانس پزشکی تماس بگیرید.

چه داروهایی بر پلاویکس تأثیر می گذارند؟

آسپرین

وارفارین یا کومادین

، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی مانند (آسپرین نپروکسن دیکلوفناک ایندومتاسین ملوکسیکام و ایبوپروفن)

ضد افسردگی مانند (فلوکستین دولوکستین پاروکستین ترازودون و...)