



پلاویکس

پلاویکس نوعی داروی ضد انعقاد است که برای کاهش میزان خطر ایجاد لخته‌های خونی در شریانها استفاده می‌شود.

داروی کلوبیدوگرل برای جلوگیری از حملات قلبی و سکته مغزی در افراد مبتلا به بیماری قلبی (حمله قلبی اخیر، سکته مغزی اخیر، همچنین به همراه آسپرین برای درمان بدتر شدن درد قفسه سینه یا درد قفسه سینه جدید (حمله قلبی جدید، آنژین ناپایدار) و باز نگه داشتن عروق خونی و جلوگیری از لخته شدن خون پس از برخی عمل‌ها (مانند استنت یا فنر گذاری قلب) به کار می‌رود

موارد
صرف

موارد منع
صرف

- ✓ حساسیت به این دارو یا دیگر مواد و داروها
- ✓ بارداری یا قصد باردار شدن
- ✓ شیردهی
- ✓ آسیب یا ترمومای جدی
- ✓ جراحی اخیر

در صورت مراجعه به پزشک و مراکز درمانی به هر علتی حتماً بیان کنید چه داروهایی در منزل مصرف می‌کنید **خصوصاً پلاویکس** (اسویکس و زیلت از نامهای تجاری کلوبیدوگرل)

- ✓ شرایط خونریزی (مانند زخم معده، خونریزی در چشم یا مغز)
- ✓ اختلالات خونریزی (مانند هموفیلی)
- ✓ مشکلات کبدی

هشدار و احتیاط

- در مدت درمان با این دارو در زمانهای مقرر به پزشک مراجعه نموده و تست‌های آزمایشگاهی به طور منظم انجام دهید.
- چنانچه جراحی در پیش دارید، پزشک یا دندانپزشک را از قبل در جریان مصرف داروی کلوپیدوگرل قرار دهید. پزشک ممکن است به شما دستور دهد مصرف این دارو را چند روز قبل از جراحی قطع کنید. در این مورد حتماً با پزشک قلب و عروق خود مشورت نمایید.
- برای کاهش احتمال بریدگی، کبودی یا جراحت، هنگام استفاده از اشیاء تیز مانند تیغ و ناخن گیر احتیاط کنید و از فعالیتهایی مانند ورزش‌های تماسی خودداری کنید.
- در مدت درمان با این دارو از مصرف الكل بپرهیزید.
- در مدت درمان با این دارو از مصرف گریپ فروت و آب گریپ فروت خودداری نمایید مگر اینکه پزشکتان دستور دیگری داده باشد.
- هرگز داروی کلوپیدوگرل را به فرد دیگری حتی با علائم مشابه خودتان تجویز نکنید و فقط با دستور پزشک مصرف کنید