

در روزهای آفتایی از عینک تیره استفاده کنید تا چشم شما کمتر اذیت شود زیرا چشم عمل شده نسبت به نور خوبشید حساس است.

افزایش اشکریزش بعداز عمل کاتاراکت طبیعی است. همین طور مقادیر کم ترشحات در هنگام بیدار شدن از خواب که باعث می‌شود مژه‌ها بهم بچسبد. این ترشحات را می‌توانید با دستمال تمیز پاک کنید.

مطالعه و تماشای تلویزیون و فعالیتهای عادی زندگی که همراه با فعالیت شدید جسمانی نباشد بلامانع است.

سرما یا گرمای هوا آسیبی به چشم عمل شده وارد نمی‌کند.

دید شما در چند روز اول بعد از عمل ممکن است کامل نباشد که احتمالاً بهعلت تورم قرنیه و یا وجود بخیه باشد.

وجود ترشحات مختصر، احساس خارش و قرمزی در صبح طبیعی است.

در صورت بروز این علائم به پزشک مراجعه کنید:

"مگس پران، کاهش دید، درد، قرمزی، حساسیت به نور، ترشح چرکی از چشم و دیدن نورهای چشمکزن"

۳

در هنگام ترخیص نسخه دارویی خود را تهیه نمایید و قطره‌های چشمی را به‌طوری که آموزش می‌بینید استفاده کنید.

بهتر است قطره توسط فرد دیگری در چشم شما چکانده شود. در هنگام چکاندن قطره نباید نوک قطره‌چکان با سطح قرنیه، مژه‌ها یا پلک تماس پیدا کند. در صورتی که بیش از یک قطره استفاده می‌کنید، قطره دوم حداقل ۵ دقیقه بعد از قطره اول ریخته شود. بعد از چکاندن قطره حداقل یک دقیقه چشم‌ها را ببندید و از پلک زدن‌های شدید بپرهیزید.

آرام باشید و از سرفه، عطسه کردن، زورزدن به‌هنگام اجابت مزاج و خم کردن سرو پایین آوردن کامل سر در سمت چشم مبتلا و بلند کردن اجسام سنگین خودداری کنید.

درمورد زمان غذا خوردن و ممانعت غذایی از پرستار خود صحبت کنید.

نمای خواندن از روز اول با تیمم با سنگ تمیز و وضوی جبیره بلامانع است. ولی تا یک هفته از سجده کردن خودداری و مهر را با دست به پیشانی نزدیک کنید.

۵ روز بعد از جراحی آب مروارید بدون عارضه استحمام بلامانع است.

به‌آرامی حرکت کنید و از حرکات سر به طرف بالا و پائین در تشخیص پله‌ها و اشیائی که به شما نزدیک می‌شوند استفاده کنید.

۲

به نام خدا

آب مروارید عبارت است از کدر شدن عدسی چشم که به صورت طبیعی شفاف است. مانند پنجره‌ای که بخار آب آن را تار کرده باشد، آب مروارید نیز باعث تاری دید می‌شود.

چشم سالم و طبیعی



چشم مبتلا به آب مروارید



مراقبت‌های پس از جراحی کاتاراکت(آب-مروارید):

بعد از عمل جراحی مرخص خواهید شد. در هنگام ترخیص محافظ پلاستیکی بر روی چشم عمل شده قرار دارد که این محافظ باید تا ۲۴ ساعت پس از عمل بر روی چشم بماند. روز بعد از عمل در اولین ملاقاتات با پزشک پانسمان چشم برداشته خواهد شد. در چند روز اول با کوچک‌ترین فشار، زخم ممکن است که باز شود. پوشیدن محافظ چشمی در شب برای مدت ۲ تا ۶ هفته به منظور پیشگیری از صدمات چشمی الزامی است. محافظ چشمی قابل شستشو می‌باشد. روزانه با آب و صابون بشویید.

پس از عمل جراحی به پشت بخوابید. از خوابیدن به سمت چشمی که عمل شده و یا به‌طرف شکم

۱

بپرهیزید.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

بیمارستان دکتر علی شریعتی

واحد ارتقا سلامت بیمارستان شریعتی کرج
نرسیده به ماهدشت

"مراقبت پس از جراحی‌های چشمی"



در این عمل جراحی که در مطب یا در اتاق عمل انجام می‌شود ابتدا پلک با استفاده از قطره و آمپول بی‌حسی کاملاً بی‌حس می‌شود به طوری که بیمار دردی احساس نکند. سپس شالازیون با برش کوچکی از پشت پلک تخلیه می‌شود. این برش معمولاً نیازی به بخیه ندارد و خود به خود جوش می‌خورد به علاوه چون برش در سمت داخل پلک قرار دارد محل آن از روی پلک دیده نمی‌شود. پس از تخلیه شالازیون، چشم پانسمان می‌شود و پانسمان تا چند ساعت روی چشم می‌ماند.

مراقبت‌های پس از عمل شالازیون:

پس از برداشتن پانسمان ممکن است متوجه ترشحات رقیق خونی بر روی پانسمان یا در داخل چشم شوید که این امر طبیعی است و جای نگرانی ندارد که ظرف یکی دو روز برطرف می‌شود. معمولاً پس از انجام جراحی در محل عمل کبودی و تورم ایجاد می‌شود که این امر نیز طبیعی است. کبودی پس از عمل معمولاً ظرف ۱۰ روز تا دو هفته برطرف می‌شود ممکن است چشم پزشک به شما توصیه کند که تا چند روز از قطره‌ها، پمادهای آنتی‌بیوتیک یا استروئیدی استفاده کنید. استفاده از این داروها باعث کاهش التهاب و بهبود سریع تر در صورت بروز درد می‌توانید از مسکن- محل عمل می‌شود های معمولی مثل استامینوفن برای کنترل درد استفاده کنید

تنهیه شده خرداد ۱۳۹۸ و بازنگری اردیبهشت ۱۴۰۳

گروه هدف: کلیه مراجعین

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۶۳۷۳۰۵۰۰۱ زیر

تماس بگیرید

منبع: بروونر و سودارت

بعد از جراحی آب مروارید در صورتی که لنز شما براساس بهترین دید دور تعیین شده باشد، برای دید نزدیک نیاز به عینک مطالعه خواهید داشت. که حدود یک ماه بعد از عمل تجویز می‌شود.

بسیاری از افراد در معرض بیماری‌های چشمی مانند آب‌سیاه و جداسدن شبکیه می‌باشند. که این بیماری‌ها در افرادی که تحت جراحی‌های چشم قرار گرفته‌اند حتی اگر نتیجه عمل موفقیت‌آمیز باشد، شایع‌تر است و چون در مراحل اولیه این به خصوص کسانی که بدون علامت واضح هستند، همه افراد به خصوص کسانی که جراحی‌های چشم داشته‌اند باید در فواصل منظم (حداقل یک بار در سال) توسط چشم پزشک معاینه شوند تا در صورت وجود مشکلات، درمان به موقع انجام شود.



شالازیون

شالازیون بر جستگی کوچکی در لبه پلک در زیر پوست است که در اثر انسداد مجرای خروجی غدد ترشح‌کننده چربی پلک و تجمع مواد ترشح شده در غده چربی ایجاد می‌شود. شالازیون مانند گل‌مژه به نظر می‌رسد.