

به نام خدا

حاملگی خارج رحمی چیست؟

اگر چه بیشتر بارداری ها به طور معمول در انتهای رحم پیشرفت می کنند، اما ممکن است تخمک بارور به طور نادرست در لوله رحم پایین بیاید و در همان جا بماند تخمک بارور در سطح لوله رحم می ماند، و در همان جا بارداری به وقوع می پیوندد و پیشرفت می کند. به محض اینکه حجم پیدا کرد، لوله رحم دیگر حالت انعطاف پذیری ندارد و در هم می شکند

نشانه های بارداری خارج از رحم: بی توجهی نکنید

۱- درد در شانه

۲- تهوع و استفراغ

۳- ضعف و سرگیجه

۴- احساس سنگینی در لگن

۵- فشار در ناحیه مقعد

۶- افت فشار خون

چه عاملی باعث حاملگی لوله ای میشود؟

هرعاملی که تحرک لوله را مختل کند و یا باعث انسداد روده یا التهاب مسیر لوله شود میتواند باعث حاملگی خارج رحم شود. سابقه جراحی لوله : هرگونه برش و یا جراحی لوله که باعث آسیب مجرای لوله میشود مانند بستن لوله و یا باز کردن مجدد لوله میتواند باعث حاملگی لوله ای در بارداری بعدی شود.

حاملگی نابجای قبلی

سابقه عفونت لگنی

مصرف دخانیات : میزان حاملگی نابجا در افراد سیگاری ۳/۵ برابر افراد غیر سیگاری است.

داشتن شریک جنسی متعدد

بیماریهای لوله :سل ، با ایجاد التهاب و

چسبندگی در داخل و یا اطراف لوله باعث

اختلال در حرکت لوله و حاملگی لوله ای

میشوند.

سابقه جراحی شکم :جراحی آپاندیسیت ،

سزارین و جراحی کیست تخمدان با ایجاد

چسبندگی در اطراف لوله خطر حاملگی نابجا را

افزایش میدهند. مشکلاتی مانند نازایی سقط و

وجود IUD

دو آزمایش اصلی برای تشخیص بارداری

خارج از رحم

در این مرحله، دو آزمایش این امکان را می دهند که بتواند دقیق تر اظهار نظر کرد: میزان هورمون بارداری و اکو گرافی.

_آزمایش مثبت هورمون بارداری، بارداری را تأیید می کند و به طور تخمینی مرحله پیشرفت بارداری را نشان می دهد. توجه داشته باشید که این آزمایش به این معنا نیست که جنین در حال رشد یا از بین رفتن است. برای تعیین این موارد باید آزمایش خون دومی داد تا تغییر میزان هورمون مشخص شود.





دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

بیمارستان دکتر علی شریعتی



حاملگی خارج رحم



آیا جایگزینی برای جراحی وجود دارد؟ بله، برای بارداری های خارج از رحم که زود تشخیص داده شوند، این امکان وجود دارد، در صورتی که بارداری در مراحل اولیه و میزان هورمون کم باشد. بنابراین در این شرایط می توان در لوله رحم، تحت اکوگرافی یا از مسیر کلی، یک فرآورده دارو درمانی استفاده کرد.

واحد ارتقا سلامت بیمارستان دکتر شریعتی نرسیده به
ماهدشت کرج

گروه هدف: کلیه مراجعین

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۶۳۷۳۰۵۰۱ زیر
تماس بگیرید

تهیه و تنظیم: ۱۴۰۱ مرداد بانگری تیر ۱۴۰۴

منبع: بروفر سودارت ترجمه مرجان رسولی

بارداری خارج از رحم و خطرات در کوتاه مدت و بلند مدت

فوری ترین خطر بارداری خارج از رحم شوک هموراژیک است. لوله رحم که از بین رفته است، دیگر نمی تواند خون زیادی را در خود نگه دارد. بنابراین جراحی اورژانسی ضروری است. زمانی که هموراژیک خیلی زیاد نیست، می توان بارداری خارج از رحم را با لاپاراسکوپي درمان کرد، اغلب این کار با بریدن دیواره شکمی انجام می شود.

