

بعد از جراحی

بعد از انجام عمل جراحی، بیمار مدتی در محلی در اطاق عمل به نام ریکاوری میماند. یک ساعت بعد از بیهوشی اهمیت زیادی دارد و در این مدت بیمار باید دقیقاً تحت نظر باشد تا آثار داروهای بیهوشی کاملاً از بین بروند و بعد از اینکه بیمار هوشیاری خود را بطور کامل بدست آورد به بخش منتقل میشود.

گیجی بعد از عمل

در بخش بیمار ممکن است تا مدتی حالت گیجی داشته باشد. این وضعیت به علت داروهای بیهوشی یا به علت کم خونی ناشی از خونریزی حین عمل است. حالت گیجی بیمار به تدریج بهبود میابد

خوردن و آشامیدن

بعد از جراحی تا چند ساعت نباید چیزی خورد. بعد از چند ساعت، میتوان پس از کسب اجازه از پرستار ابتدا چند قاشق آب به بیمار داد و اگر تحمل کرد و دچار ناراحتی نشد میتوان بتدریج به او مایعات بیشتری داد. بعد از اینکه رژیم غذایی برای بیمار شروع شد در صورت مبتلا نبودن به بیماریهای خاص (قلبی، تنفسی، دیابت و ...) از کلیه مواد غذایی میتوان بهره برد

دراز کشیدن

اگر بیمار با بیحسی منطقه ای عمل شده، تا ۲۴ ساعت نباید پشت تخت او را بالا آورد و در این مدت سر بیمار باید کاملاً پایین باشد وگرنه دچار سردرد شدید میشود که ممکن است تا چند روز ادامه یابد.

درد بعد از جراحی

در چند روز اول بعد از عمل بیمار در محل جراحی احساس درد دارد. شدت این درد بسته به نوع جراحی، سن بیمار و تحمل بیمار به درد متفاوت است. در بیمارستان مسکن های قوی به بیمار داده میشود تا شدت درد را کاهش دهد. این مسکن ها معمولاً مخدر هستند. مصرف این مسکن تزریقی نباید زیاد باشد چون موجب مسمومیت میشود. بیمار نباید انتظار داشته باشد با مصرف دارو درد وی کاملاً برطرف شود. ممکن است کمی از درد باقی بماند

بعد از مرخص شدن بیمار از بیمارستان ممکن است پزشک معالج برای بیمار مسکن های خوراکی تجویز کند.

خطر عفونت بعد از جراحی

در هر عمل جراحی احتمال عفونت در محل عمل وجود دارد. در صورت صلاح دید پزشک در چند روز اول بعد از عمل جراحی، به بیمار چرک خشک کن (آنتی بیوتیک) داده میشود تا احتمال عفونت بعد از عمل جراحی کاهش پیدا کند



لخته شدن خون در رگ ها

یکی از عوارض جراحی ها لخته شدن خون در رگ است. میتواند بسیار خطرناک باشد. ممکن است موجب رد شدن این لخته در خون (آمبولی) و اختلال در عملکرد قلب و ریه شود. این عارضه بخصوص در شکستگی های اندام تحتانی و در سنین بالا بیشتر دیده میشود. بعد از جراحی به بیمار داروهایی داده میشود تا از لخته شدن خون در پاها جلوگیری شود. به این داروها داروهای رقیق کننده خون میگویند. استفاده از این داروها ممکن است تا چند هفته بعد از جراحی هم ادامه پیدا کند.

اگر بیمار منعی در راه رفتن نداشته باشد، برای پیشگیری از این عارضه پزشک و پرستاران به شما توصیه می کنند که باکمک ز تخت خارج شوید و راه بروید این امر در افزایش جریان خون و پیشگیری از بروز لخته بسیار کمک می کند

درن چیست:

جراح در حین عمل جراحی ممکن است لوله های پلاستیکی در درون زخم بیمار بگذارد تا بدین وسیله خونریزی مختصر داخل بدن که ممکن است تا چند ساعت بعد از جراحی هم ادامه داشته باشد به بیرون از بدن هدایت کند. باقی ماندن خون در درون بافت ها خطر عفونت بعد از جراحی را بیشتر میکند و این خونریزی ها باید در صورت وجود از بدن به وسیله این لوله ها خارج شوند



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

بیمارستان دکتر علی شریعتی

مراقبتهای بعد جراحی



راه رفتن ، حرکت کردن.

روز بعد از جراحی به بیمار آموزش داده میشود تا چطور بتواند در تخت یا روی صندلی بنشیند و چطور توسط عصای زیر بغل یا واکر راه برود یا چطور اندامها و مفاصلش را حرکت دهد تا از خشکی آنها جلوگیری شود.

گاهی اوقات این حرکات چند ساعت بعد از جراحی شروع میشود. گاهی یک نفر مفصل بیمار را خم و راست میکند. بعد از مدتی به بیمار آموزش داده میشود که خودش مفاصل مورد نظر را حرکت دهد. و در صورت صلاحدید پزشک بیمار می بایست از تخت خارج شده و راه برود.

راه رفتن باعث جریان بهتر خون و بهبودی سریع تر زخم می شود و نیز از عوارضی همچون نفخ کردن و در موارد حاد تر از آمبولی بعد عمل جلوگیری می نماید

واحد ارتقا سلامت بیمارستان دکتر شریعتی نرسیده به
ماهدهشت کرج

گروه هدف: کلیه مراجعین جهت جراحی

تهیه: ۱۴۰۱ بازنگری: مرداد ۱۴۰۴

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس با شماره ذیل
۰۲۶۳۷۳۰۵۰۰۱ تماس حاصل فرمایید

منبع: وبسایت تبیان

مقاله مرتبط: دستورالعمل های لازم جهت نظافت سریع بین
دو عمل جراحی

لوله ها در بیرون از بدن به کیسه های پلاستیکی متصل میشوند تا خون در آنها جمع آوری شود. به این لوله ها که در محل جراحی گذاشته شده است درن میگویند. این لوله ها بعد از چند روز از زخم خارج میشوند.

اگر به هر دلیلی درن از محل خارج شد دست خود را بر روی آن ناحیه گذاشته و پرستار را خبر کنید

تعویض پانسمان

معمولا پانسمان زخم جراحی تا چند روز بعد از عمل جراحی تعویض نمیشود. پس از چند روز این پانسمان با نظر پزشک توسط پرستار عوض میشود. تعویض پانسمان باید بعد از مرخص شدن بیمار در منزل و توسط فرد مجرب انجام شود. دفعات تعویض پانسمان و نحوه آن توسط پزشک معالج تعیین میشود

حمام کردن

نظر پزشک خود را در مورد نحوه و زمان حمام کردن و مراقبت از زخم را حتما بپرسید. به صورت کلی در جراحی های عمومی و سزارین حمام سه روز بعد از جراحی بلامانع است. اما در جراحی های مغز و اعصاب ناحیه عمل تا ده روز نباید آب بخورد و حمام روز سوم تنها با پانسمان ضد آب امکان پذیر می باشد

